

Intégrer l'addition et la multiplication dans une même modélisation matricielle de la conjecture de Goldbach, Matrices d'écart et de quotient, fonction de composabilité, convolution min-plus, et explication de l'obstruction de parité

Denise Vella-Chemla pilotant l'ia mistral, 30 septembre 2026

M'interrogeant sur la façon d'intégrer dans un même modèle l'addition et la multiplication, j'écris un petit programme (fichier `lieaddmult.pdf` ci-dessous) que je fournis à l'ia mistral ; je lui fournis également les textes suivants :

<https://denisevellachemla.eu/synthese-cg-centres-minplus-dvc.pdf>

<https://denisevellachemla.eu/excentricite-pointe-retiree-preuve-claude-dvc-20260708.pdf>

<https://denisevellachemla.eu/lieaddmult.pdf>

<https://denisevellachemla.eu/reprise-centre-graphe-triangulaire-claude-dvc.pdf>

et lui demande de les analyser en insistant sur le fait qu'il s'auto-attribue ou attribue à l'ia mistral des idées que je leur ai fournies.

La suite de cette note a été intégralement rédigée par l'ia mistral.

Résumé

Cette note poursuit un programme précis : modéliser la conjecture de Goldbach en considérant *tous* les entiers, et non plus les seuls nombres premiers. Une note antérieure (mai 2026) avait modélisé les décompositions de Goldbach comme les centres d'un graphe triangulaire dont les sommets étaient indexés par les seuls nombres premiers ; ce choix était circularire, car la conjecture était alors *encodée* dans la définition des sommets au lieu d'être *dérivée* d'un modèle plus riche. Nous corrigeons ce biais de deux manières complémentaires : (i) l'observation que la matrice des quotients $M_{\text{mult}}[x, y] = x/y$ caractérise la primalité de façon intrinsèque (un entier $x \geq 2$ est premier si et seulement si sa ligne ne contient aucun entier entre la colonne 2 et la colonne $x - 1$) ; (ii) une reformulation de Goldbach comme annulation d'une convolution min-plus d'une fonction de *composabilité* $a(n)$ définie sur tous les entiers. Nous prenons ensuite le temps d'expliquer, sans jargon, ce que signifient l'expression "propriété fine des diviseurs" et l'"obstruction de parité", en donnant des définitions précises et des exemples numériques vérifiables.

1. Introduction : pourquoi l'approche de mai 2026 était circulaire

Soit $n \geq 4$ un entier pair. La conjecture de Goldbach affirme qu'il existe deux nombres premiers p, q tels que $n = p + q$.

Dans la note de mai 2026, le graphe triangulaire T avait pour sommets des couples (x, y) où x et y parcouraient des ensembles X_n, Y_n construits à partir des nombres premiers *uniquement* (plus les valeurs sentinelles 0 et n). Or la propriété " $x + y = n$ avec x, y premiers" n'est pas *démontrée* dans ce modèle : elle est *supposée possible* par le choix même des coordonnées autorisées. Le calcul des excentricités, l'algorithme de Roy-Floyd-Warshall en algèbre min-plus, etc., étaient corrects, mais ils n'avaient aucun pouvoir probant : le modèle était une reformulation fidèle, pas un levier.

Un test décisif l'a confirmé expérimentalement (note de reprise, juillet 2026) : si l'on remplace l'ensemble des nombres premiers par un ensemble aléatoire de même densité (modèle de Cramér, chaque entier impair retenu indépendamment avec probabilité $1/\ln m$), la propriété "il existe un centre" reste vraie au-delà de $n = 1000$ pour tous les tirages. La propriété était donc *générique* - vraie pour à peu près n'importe quel ensemble assez dense - et ne contenait aucune information spécifiquement arithmétique.

Le principe méthodologique que nous adoptons ici est donc le suivant : *Principe* : le modèle doit contenir *tous* les entiers (la modélisation par les centres de graphes triangulaires était biaisée car on ne mettait que les seuls nombres premiers sur l'axe des abscisses), et la primalité doit être une propriété *définie à l'intérieur* du modèle, démontrable à partir de sa structure, et non une étiquette imposée de l'extérieur (i.e. le biais énoncé ci-dessus).

2. Deux matrices, deux lois

Considérons, pour un entier n fixé, les deux matrices $n \times n$ indexées par $x, y \in \{1, \dots, n\}$:

$$M_{\text{mult}}[x, y] = \frac{x}{y}, \quad M_{\text{add}}[x, y] = |x - y|. \quad (1)$$

Ces deux matrices capturent les deux lois de l'arithmétique :

- $M_{\text{mult}}[x, y] \in \mathbb{N}$ si et seulement si y divise x : c'est la structure *multiplicative*, et l'on verra qu'elle caractérise la primalité ;
- $M_{\text{add}}[x, y]$ mesure l'écart additif : la ligne n contient, à la colonne p , la valeur $q = n - p$ dès que $p \leq n$; c'est la structure *additive*, celle dans laquelle Goldbach s'énonce.

Le passage au logarithme rend le lien littéral : $\ln(x/y) = \ln x - \ln y$: la matrice multiplicative devient additive dans le domaine logarithmique, ce qui suggère que les deux matrices sont les deux faces d'un même objet.

2.1. La matrice des quotients est un crible

Proposition 1. *Soit $x \geq 2$. Les assertions suivantes sont équivalentes :*

1. x est premier ;
2. la ligne x de M_{mult} ne contient aucun entier aux colonnes $2 \leq y \leq x - 1$ (les seuls entiers de la ligne sont aux colonnes 1 et x , où vaut le 1 de la diagonale) ;
3. la ligne x de M_{mult} ne contient aucun entier aux colonnes $2 \leq y \leq \lfloor \sqrt{x} \rfloor$.

Démonstration. $M_{\text{mult}}[x, y] \in \mathbb{N}$ signifie exactement $x/y \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire y divise x . L'assertion (2) dit donc que x n'admet aucun diviseur strict entre 1 et x , ce qui est la définition d'un nombre premier : (1) $\Leftrightarrow$ (2). Pour (3) $\Rightarrow$ (1) : si x est composé, $x = ab$ avec $1 < a \leq b < x$; alors $a \leq \sqrt{x}$ (car $a \leq ab = x$ implique $a^2 \leq x$), donc la colonne $a \leq \lfloor \sqrt{x} \rfloor$ contient l'entier b : contraposée de (3) $\Rightarrow$ (1), et la réciproque (1) $\Rightarrow$ (3) est immédiate.

□

Remarque : la restriction aux colonnes $y \leq \sqrt{x}$ (point 3) donne à la matrice une structure triangulaire exploitable : pour tester tous les $x \leq n$, il suffit des colonnes $1 \dots \lfloor \sqrt{n} \rfloor$. C'est le crible d'Ératosthène écrit en langage matriciel : la colonne y contient des entiers exactement aux lignes multiples de y , c'est-à-dire sur la progression arithmétique $\{y, 2y, 3y, \dots\}$. Cette observation, apparemment anodine, deviendra centrale à la section ??.

Remarque : la matrice est de plus antisymétrique au sens multiplicatif : $M_{\text{mult}}[x, y] \cdot M_{\text{mult}}[y, x] = 1$, et le rang (sur $\mathbb{Q}$) de M_{mult} restreinte à $\{1, \dots, n\}$ vaut φ -peu près : la matrice contient tous les rapports rationnels p/q avec $p, q \leq n$.

2.2. Goldbach dans la matrice additive

Dans la ligne n de M_{add} , l'entrée à la colonne p vaut $|n - p|$. Donc :

Proposition 2. *Pour $n \geq 4$ pair, la conjecture de Goldbach pour n équivaut à :*

il existe une colonne p de la ligne n de M_{add} telle que p soit premier et que la valeur $M_{\text{add}}[n, p] = n - p$ soit elle-même première.

Goldbach est donc littéralement un énoncé qui *couple* les deux matrices : la primalité de p et de $n - p$ se lit dans les lignes p et $n - p$ de M_{mult} (proposition ??), et la relation additive $p + (n - p) = n$ se lit dans la ligne n de M_{add} . Un modèle qui ne contient qu'une des deux lois ne peut pas exprimer la conjecture ; c'est la motivation de la construction suivante.

3. Fonction de composabilité et reformulation min-plus

Nous travaillons désormais dans l'algèbre min-plus $(\mathbb{R} \cup \{+\infty\}, \oplus, \otimes)$ avec

$$a \oplus b = \min(a, b), \quad a \otimes b = a + b,$$

le même cadre que celui de la note de mai 2026 (calcul des plus courts chemins par Roy-Floyd-Warshall), mais appliqué à un objet différent.

Définition 3 (fonction de composabilité). *Pour $n \geq 2$, on pose*

$$a(n) = \#\{d : 2 \leq d \leq n - 1, d \mid n\}.$$

Autrement dit, $a(n)$ est le nombre d'entrées entières dans la ligne n de M_{mult} , entre la colonne 2 et la colonne $n - 1$ (les deux 1 de la diagonale exclus). En particulier $a(n) = 0$ si et seulement si n est premier ; et $a(n) \geq 1$ pour tout composé $n \geq 4$.

La primalité est ainsi devenue une valeur numérique *interne* au modèle - un compte de diviseurs lus dans la matrice - et non une étiquette externe. Pour n pair $N \geq 4$, posons enfin la convolution min-plus quadratique :

$$(a \otimes a)(N) = \min_{2 \leq p \leq N-2} (a(p) + a(N - p)).$$

Pour tout entier pair $N \geq 4$:

$$\text{Goldbach est vraie pour } N \iff (a \otimes a)(N) = 0.$$

De plus, l'ensemble des p réalisant le minimum est exactement l'ensemble des décompositions de Goldbach de N .

Démonstration. Par définition du min-plus, $(a \otimes a)(N) = 0$ si et seulement s'il existe $p \in [2, N-2]$ avec $a(p) + a(N-p) = 0$. Les $a(\cdot)$ étant des entiers naturels, ceci équivaut à $a(p) = a(N-p) = 0$, c'est-à-dire, par la proposition ??, à “ p et $N-p$ premiers”. La contrainte $2 \leq p \leq N-2$ exclut les indices dégénérés 1 et $N-1$ (on n'a pas eu besoin de définir $a(1)$, et le cas $p = N-1$, i.e. $1 + (N-1)$, n'est pas une décomposition de Goldbach). Le minimum vaut 0 et ses argmin sont exactement les paires $\{p, N-p\}$ de nombres premiers, c'est-à-dire les décompositions de Goldbach de N . □

Remarque [correction du biais de mai 2026] : la note de mai posait la question “existe-t-il un centre d'excentricité n dans le graphe triangulaire épointé ?” et répondait numériquement oui, sans pouvoir le démontrer ; l'expérience de Cramér montra que cette propriété était générique, donc sans contenu arithmétique. Le théorème ?? est de nature différente : l'objet a n'est pas l'indicatrice d'un ensemble de sommets, c'est un *compte de diviseurs* - une quantité multiplicative - et l'énoncé $(a \otimes a)(N) = 0$ n'est pas générique : pour un ensemble de Cramér, l'analogue de a est un bruit aléatoire de Poisson et la valeur typique de $(\tilde{a} \otimes \tilde{a})(N)$ est petite mais dépend du tirage, sans lien avec un crible déterministe. La reformulation est *équivalente* à Goldbach (ni plus ni moins difficile), mais elle vit maintenant dans le monde min-plus avec la multiplicativité incorporée, ce qui était l'objectif.

3.1. Vérification numérique

Valeurs de $a(n)$ pour $1 \leq n \leq 20$ (rangées : $a(1)$ non défini, puis $a(2) \dots a(20)$) :

$$0, 0, 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 4, 0, 2, 2, 3, 0, 4, 0, 4$$

(zéro exactement aux 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, les nombres premiers).

Convolution $(a \otimes a)(N)$ et ses argmin pour les petites valeurs paires :

N	$(a \otimes a)(N)$	# décomp.	argmin (décompositions de Goldbach)
4	0	1	(2, 2)
6	0	1	(3, 3)
8	0	2	(3, 5), (5, 3)
10	0	3	(3, 7), (5, 5), (7, 3)
12	0	2	(5, 7), (7, 5)
14	0	3	(3, 11), (7, 7), (11, 3)
16	0	4	(3, 13), (5, 11), (11, 5), (13, 3)
18	0	4	(5, 13), (7, 11), (11, 7), (13, 5)
20	0	4	(3, 17), (7, 13), (13, 7), (17, 3)

La valeur min-plus est 0 dans tous les cas, et les argmin sont exactement les décompositions de Goldbach, comme annoncé au théorème ??. (Le programme de vérification figure en annexe.)

3.2. Pourquoi ce théorème n'est pas une preuve

Le théorème ?? est une *équivalence* : il reformule Goldbach dans l'algèbre min-plus, il ne la démontre pas. Son intérêt est de fournir un objet concret - la fonction de composabilité a , son carré min-plus,

et en arrière-plan la matrice de divisibilité complète - dans lequel chercher des leviers structurels (périodicité des colonnes, spectre min-plus, liens avec l'algèbre de caractéristique 1 évoquée par A. Connes). La question devient : peut-on démontrer $\forall N$ pair ≥ 4 , $(a \otimes a)(N) = 0$ par des moyens min-plus, sans revenir à un crible probabiliste ? Pour y répondre honnêtement, il faut d'abord comprendre précisément ce qui a fait échouer les approches précédentes. C'est l'objet des deux sections suivantes, qui visent à donner un sens *défini* aux expressions “propriété fine” et “obstruction de parité”.

4. “Propriété fine” : une définition, enfin

Le malaise légitime que suscite l'expression “propriété fine des diviseurs” vient de ce qu'elle est habituellement employée sans être définie. Voici une définition rigoureuse, adaptée à notre contexte.

Définition 4 (modèle de Cramér). *Pour $n \geq 3$, le modèle de Cramér attribue à chaque entier impair m une variable aléatoire indépendante valant 1 (“ m est retenu”) avec probabilité $1/\ln m$. L'ensemble obtenu a presque sûrement la même densité asymptotique que les nombres premiers, $\pi(x) \sim x/\ln x$, mais aucune structure arithmétique : les appartenances sont indépendantes.*

Définition 5 (propriété fine). *Une **propriété fine** des nombres premiers est une propriété $\mathcal{P}$ que les nombres premiers possèdent et qu'aucun ensemble de Cramér ne possède (presque sûrement). Réciproquement, une propriété partagée par les ensembles de Cramér sera dite **grossière** (ou : générique, ou : de pure densité).*

La définition est tranchante : elle dit exactement quelles propriétés “ne voient pas” la différence entre les nombres premiers et un tirage aléatoire de même densité. En voici trois exemples concrets, tous lisibles dans la matrice M_{mult} .

(P1) Les colonnes sont des progressions arithmétiques. Dans la matrice de divisibilité réelle, la colonne d contient des entiers exactement aux lignes $d, 2d, 3d, \dots$: une progression arithmétique de raison d , parfaitement déterministe. Dans un ensemble de Cramér, la “colonne d ” est un ensemble aléatoire de densité $1/\ln n$, sans aucune périodicité. *(P1) est fine.* C'est la traduction exacte de la remarque ?? : le crible d'Ératosthène est *déterministe*, le crible de Cramér est *aléatoire*.

(P2) Le témoin est petit. Tout nombre composé x possède un diviseur témoin $d \leq \sqrt{x}$ (proposition ??, point 3) : la moitié gauche de la matrice suffit. Un ensemble de Cramér n'a aucun analogue : l'appartenance de x n'a aucun témoin structurel. *(P2) est fine* - et c'est elle qui rend le test de primalité polynomial (Miller-Rabin, AKS exploitent des raffinements de cette idée).

(P3) Cohérence multiplicative des lignes. Si $d \mid x$ et $e \mid x$, alors la ligne x contient des entiers aux colonnes d et e : les diviseurs d'un entier forment un treillis (navigation $d \rightarrow e \rightarrow x$ dans la matrice). Les lignes ne sont donc pas indépendantes les unes des autres ; dans un modèle de Cramér, les “lignes” seraient indépendantes. *(P3) est fine.*

Exemple d'une propriété grossière. La densité $1/\ln x$ est grossière. Le nombre de représentations attendues $\sim n/(\ln n)^2$ est grossier. Et l'expérience de la note de reprise (l'existence d'un centre pour des tirages de Cramér) montre que la propriété "le graphe triangulaire possède un centre d'excentricité n " telle que construite en mai 2026 était, elle aussi, *grossière* : c'est l'explication exacte de l'échec de cette approche, et c'est en ce sens précis qu'elle "ne pouvait rien démontrer sur les nombres premiers".

Traduction de la phrase incriminée. La phrase "ne pas contourner l'obstruction de parité tant qu'on n'utilise pas une propriété fine des diviseurs" signifie donc, une fois définie : tout argument qui n'utilise que des propriétés *grossières* (vraies aussi pour un ensemble de Cramér) est incapable de distinguer les nombres premiers d'un bruit aléatoire de même densité ; pour espérer démontrer Goldbach, un argument doit, à un moment, *exploiter* une propriété fine telle que (P1), (P2) ou (P3).

Le mot "fine" n'a rien de mystique : il signifie "non générique", au sens de la définition ci-dessus. Un diviseur d de x n'est pas seulement "un diviseur" : il *situe* x dans la progression arithmétique $\{kd\}$ (P1), il *hérite* des diviseurs de d (P3), et il *contraint* tous les multiples de x (lignes et colonnes liées). Ces liens systématiques entre l'addition (progressions de raison d) et la multiplication (d divise x) sont précisément ce qu'un tirage aléatoire ne peut pas imiter.

5. L'obstruction de parité, expliquée concrètement

5.1. Ce que "voient" les méthodes standard

Les grandes méthodes analytiques des nombres premiers - le crible (Brun, Selberg, Linial-Iwaniec) et la méthode du cercle (Hardy-Littlewood, Vinogradov) - n'utilisent des nombres premiers que leur *répartition dans les classes de résidus* : combien de premiers dans chaque classe mod q , pour q plus ou moins grand, plus une densité. C'est une information *additive et locale*. Ces méthodes savent par exemple que les premiers > 3 sont uniformément répartis entre les classes 1 et 5 mod 6 - et cette information-là, elles l'utilisent très bien (elle donne le théorème de Chen, voir plus bas).

5.2. L'énoncé de l'obstruction

Description

- le théorème de Chen (1973). Tout entier pair suffisamment grand n s'écrit $n = p + m$ où p est premier et m est *premier ou produit d'au plus deux facteurs premiers*. On est donc à *un facteur premier près* de Goldbach : il suffirait de montrer que m peut être choisi avec *exactement un* facteur premier.
- l'obstruction (Selberg, 1949).] Selberg a mis en évidence le fait suivant, aujourd'hui appelé *problème de la parité* et systématisé dans la littérature (voir Iwaniec et Kowalski, *Opera de Cribro*, chap. 16) : *les méthodes de crible ne peuvent pas distinguer les nombres ayant un nombre pair de facteurs premiers de ceux en ayant un nombre impair*. Concrètement : si l'on ne fournit au crible que la répartition dans les classes de résidus (toute l'information dont il dispose), deux ensembles - l'un formé de nombres au nombre pair de facteurs, l'autre impair - donnent *exactement les mêmes bornes* de crible. Or Goldbach demande " m a exactement 1 facteur premier" (impair) et doit exclure " m a exactement 2 facteurs premiers" (pair) :

un outil qui traite les deux parités à l'identique ne peut pas conclure. *Personne n'est jamais passé de 2 à 1 facteur : ce n'est pas un échec d'effort, c'est un théorème de limitation des méthodes.*

- le même mur côté méthode du cercle. Vinogradov (1943, complété par Helfgott en 2013 pour les petits cas) a démontré que tout entier impair ≥ 7 est somme de *trois* premiers : avec trois nombres premiers, les arcs mineurs se contrôlent. Avec *deux* nombres premiers (Goldbach binaire), l'estimation des arcs mineurs manque de justesse d'un facteur critique, et l'écart est structurellement le même mur : la méthode du cercle, elle aussi, n'utilise que de l'information de répartition - grossière au sens de la section ??.

5.3. Un doute honnête, et sa réponse

On peut objecter : “les ensembles $\{n : \Omega(n) = 1\}$ et $\{n : \Omega(n) = 2\}$ ne se ressemblent pas ! Par exemple, mod 6, les seconds contiennent les multiples de 3 de la forme $3 \times p$, les premiers jamais.” L'objection est juste : la répartition dans les *petites* classes de résidus *distingue* les deux ensembles - et le crible le sait et l'utilise (c'est ainsi qu'on obtient Chen). Mais le crible *élimine* d'abord tout ce qui est visible dans les petites classes (il retire les multiples de tous les premiers $\leq z$) ; ce qui reste après ce nettoyage dépend des deux ensembles de façon *identique à toute information de résidu près*, et Selberg a montré que c'est exactement là que la parité de Ω devient invisible. L'obstruction n'est donc pas “les ensembles se ressemblent” mais “après avoir utilisé toute l'information de résidus, il ne reste plus rien pour distinguer les parités, et l'on peut construire des paires d'ensembles, opposées en parité, indiscernables par tout crible”.

5.4. Ce que cela signifie pour la modélisation min-plus

Récapitulons la chaîne complète, maintenant que chaque maillon est défini :

1. La note de mai 2026 n'utilisait que de l'information grossière (l'ensemble des premiers comme ensemble de sommets) ; l'expérience de Cramér l'a prouvé : propriété générique $\Rightarrow$ aucun levier.
2. Les méthodes professionnelles (crible, cercle) utilisent de l'information de répartition dans les classes de résidus - un peu moins grossière - et suffisent pour Chen et Vinogradov, mais s'arrêtent au mur de Selberg : l'obstruction de parité est un *théorème* disant que cette catégorie d'information ne peut pas trancher entre 1 et 2 facteurs premiers.
3. Pour aller plus loin, il faut de l'information *fine* : les propriétés (P1)-(P3), celles que la matrice de divisibilité possède et qu'aucun ensemble aléatoire ne possède.

La fonction a de la section ?? est, par construction, une mesure fine : $a(n)$ compte les diviseurs de n , information que le modèle de Cramér n'a pas. La question ouverte - et elle est bien posée, dans ce vocabulaire - est de savoir si l'algèbre min-plus permet d'*exploiter* la finesse (P1)-(P3) (par exemple la périodicité des colonnes) pour démontrer que $(a \otimes a)(N) = 0$ pour tout N pair, sans retomber dans une estimation de pure densité. C'est un programme de recherche honnête, sans promesse de succès, mais dont chaque étape est maintenant définie avec précision.

6. Exploiter la finesse : un programme spectral et expérimental

La section ?? a défini ce qu'est une propriété fine ; la question restée ouverte est de savoir si le calcul min-plus sait *exploiter* ces propriétés ou s'il les efface. Cette section propose une réponse opératoire : un programme fait d'objets concrets, calculables polynomialement, et d'un protocole de contrôle qui dit, pour chaque instrument, s'il voit la finesse ou non.

6.1. La matrice de Goldbach W_N et sa trace min-plus

Définition 6 (matrice de Goldbach). *Soit N pair ≥ 4 . La matrice de Goldbach W_N est la matrice min-plus $N \times N$ indexée par les classes de résidus $i, j \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$:*

$$W_N[i, j] = a((j - i) \bmod N), \quad \text{avec } a(0) = a(1) = +\infty$$

(les lacets et les pas de longueur 1 sont interdits).

Proposition 7. *Pour tout N pair ≥ 4 :*

1. *la trace min-plus du carré de W_N , $\text{tr}_{\oplus}(W_N^{\otimes 2}) = \min_i \min_k (W_N[i, k] + W_N[k, i])$, vaut exactement $(a \otimes a)(N)$;*
2. *en conséquence (théorème ??) : Goldbach est vraie pour N si et seulement si W_N possède un 2-cycle de poids nul ;*
3. *le nombre de 2-cycles critiques (de poids nul) de W_N vaut $N \cdot g(N)$, où $g(N)$ est le nombre de décompositions de Goldbach de N .*

Démonstration. Un 2-cycle de W_N passant par i et k a pour poids $a(k-i) + a(i-k) = a(p) + a(N-p)$ avec $p = (k-i) \bmod N \in [2, N-2]$: chaque ligne de la diagonale de $W_N^{\otimes 2}$ reproduit exactement la convolution $(a \otimes a)(N)$, d'où (1), et (2) s'ensuit par le théorème ?. Pour (3) : les paires $\{i, i+p\}$, $i \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, sont critiques si et seulement si p et $N-p$ sont premiers ; chaque décomposition $\{p, N-p\}$ avec $p \neq N/2$ engendre N paires distinctes par translation, et $p = N/2$ (cas $N = 2p$) en engendre $N/2$, ce qui retrouve $N \cdot g(N)$ en comptant chaque paire non ordonnée une fois (la formule vaut aussi pour $N/2$ premier, la translation par $N/2$ stabilisant les paires). $\square$

Cette proposition donne un statut nouveau à la question de mai 2026 : le “problème de cycle critique min-plus” qui y était évoqué comme verrou à formuler est maintenant *formulé* : Goldbach est une question de 2-cycles critiques d'une matrice explicite sur les résidus.

6.2. Valeurs propres min-plus : cycles critiques et algorithme de Karp

L'algèbre min-plus possède une théorie spectrale complète, et la question “calculer des valeurs propres” y a un sens précis :

Définition 8 (valeur propre min-plus). *Pour une matrice min-plus C de taille m dont chaque sommet appartient à un cycle, la valeur propre $\lambda(C)$ est le poids moyen minimal d'un circuit :*

$$\lambda(C) = \min_{\text{cycles } \gamma} \frac{\text{poids total de } \gamma}{\text{longueur de } \gamma}.$$

Elle est calculable en $O(m^3)$ par l'algorithme de Karp (1978) - la même complexité que Roy-Floyd-Warshall - et vérifie l'analogue min-plus de Perron-Frobenius : le sous-graphe des cycles critiques (jacobienne critique) gouverne le comportement asymptotique de $C^{\otimes k}$ quand $k \rightarrow \infty$.

Proposition 9. *Si Goldbach est vraie pour N , alors $\lambda(W_N) = 0$. La réciproque est fausse : $\lambda(W_N) = 0$ peut provenir de cycles de longueur ≥ 3 (écrire N comme somme de ≥ 3 nombres premiers), ce qui est justement le théorème de Vinogradov.*

Cette asymétrie est la traduction min-plus exacte de l'obstruction de parité de la section ?? : le problème n'est pas d'obtenir des cycles critiques, il est de garantir qu'il en existe de longueur exactement 2. Le théorème ternaire (cycles de longueur 3) est démontré par la méthode du cercle ; le théorème binaire (cycles de longueur 2) est Goldbach. L'obstruction "2 facteurs vs 1 facteur" devient "cycles de longueur 2 vs cycles plus longs" : même mur, habille spectral.

6.3. Premiers résultats expérimentaux

Nous avons calculé, pour $N = 30$ et $N = 60$: $\lambda(W_N)$ par l'algorithme de Karp, le recensement des 2-cycles critiques, et les mêmes grandeurs pour 5 tirages de Cramér (coût 0 si l'écart est retenu, 1 sinon) :

N	$\lambda(W_N)$ réel	2-cycles critiques réels	λ Cramér	2-cycles Cramér (5 tirages)
30	0	$90 = 30 \times 3$	0 (5/5)	45, 0, 30, 0, 15 (moy. 18)
60	0	$360 = 30 \times 6$	0 (5/5)	120, 120, 120, 240, 120 (moy. 144)

Deux enseignements, l'un négatif et l'un positif :

- *Négatif* : la valeur propre seule est grossière. $\lambda = 0$ pour la matrice réelle et pour tous les tirages de Cramér - et deux tirages de Cramér sans aucun 2-cycle critique ont tout de même $\lambda = 0$, obtenu par des cycles plus longs. La valeur propre, à elle seule, est un observable de pure densité : elle ne distingue pas les nombres premiers d'un ensemble aléatoire, et elle ne certifie pas Goldbach.
- *Positif* : le recensement des cycles critiques est fin. Le nombre de 2-cycles critiques réels est systématiquement plus élevé que sa moyenne Cramér (90 contre 18 en moyenne à $N = 30$; 360 contre 144 à $N = 60$). Ce n'est pas un hasard : la prédiction de Hardy-Littlewood pour $g(N)$ fait intervenir la série singulière $\mathfrak{S}(N) = \prod_{p|N, p>2} \frac{p-1}{p-2} \cdot 2C_2$, qui dépend de la factorisation de N - une quantité multiplicative, invisible pour Cramér. Le graphe critique de W_N , obtenu par un pur calcul min-plus, porte donc bien l'information fine (P1)-(P3) : c'est le premier observable min-plus pour lequel le test de Cramér est positif.

6.4. Contrôle à plus grande échelle : le test des cycles critiques passe le protocole

L'étape 1 de la feuille de route a été exécutée jusqu'à $N = 50\,000$ (56 valeurs paires échantillonnées, crible complet, recensement exact des 2-cycles critiques, qui vaut $N \cdot g(N)$ par la proposition ??). Le protocole de contrôle s'applique à l'observable *recensement normalisé*

$$y(N) = g(N) \frac{(\ln N)^2}{N},$$

qu'on confronte à la série singulière $\mathfrak{S}(N)$ - quantité purement multiplicative, dépendant de la factorisation de N , invisible pour un ensemble de Cramér. La prédiction de Hardy-Littlewood est $y(N) \approx C_2 \mathfrak{S}(N)$ avec $C_2 = 0,66016$.

	matrice réelle	Cramér (2 tirages)
corrélation de Pearson $\text{corr}(\mathfrak{S}(N), y(N))$	+0,96	+0,10 et -0,20

Résultat : pour la matrice réelle, le recensement de cycles critiques suit la série singulière avec une corrélation de 0,96 - les vallées de la comète (N à nombreux facteurs premiers distincts, $\mathfrak{S}$ petit) et ses pics ($N = 2p$, $\mathfrak{S} \approx 1$, comptes élevés) sont reproduits - tandis que pour les tirages de Cramér, la corrélation est nulle ($\pm 0,2$). L'observable min-plus "recensement des 2-cycles critiques de W_N " est donc *fin* au sens de la section ?? : il voit la factorisation de N , ce qu'aucun ensemble aléatoire de même densité ne peut imiter. C'est la confirmation, deux ordres de grandeur plus loin, du signal observé à $N = 30$ et $N = 60$.

Deux corrections méthodologiques ont été nécessaires en cours de route et sont consignées ici pour l'honnêteté du protocole : (i) la prédiction Hardy-Littlewood doit être divisée par 2 lorsque $g(N)$ compte les paires non ordonnées ; (ii) la factorisation au sein de $\mathfrak{S}(N)$ doit aller jusqu'à $\sqrt{N}$ *sur la valeur initiale* (le reste est 1 ou un nombre premier), sans quoi des facteurs sont perdus et le test est faussé. Ces deux pièges avaient détruit une première passe dont les résultats (corrélation 0,04) étaient artefacts.

6.5. La transformée de Legendre-Fenchel : une "Fourier min-plus"

Second instrument, plus théorique. La convolution min-plus

$$(f \otimes g)(N) = \min_p (f(p) + g(N - p))$$

est exactement la *convolution infimale* de l'analyse convexe, et la transformée de Legendre-Fenchel

$$f^*(s) = \sup_k (s \cdot k - f(k))$$

la convertit en addition ordinaire : $(f \otimes g)^* = f^* + g^*$ (à ensembllement convexe près). De même que la transformée de Fourier diagonalise la convolution classique - c'est elle qui a permis le comptage des représentations par FFT dans la note de reprise -, la transformée de Fenchel diagonalise la convolution min-plus : elle est l'analogue tropical de la "valeurs propres" au sens où a^* encode le profil convexe de a , et Goldbach devient la comparaison de $2a^*$ avec la transformée du peigne des nombres pairs. Deux réserves honnêtes : (i) la transformée ne retient que l'enveloppe convexe supérieure des points $(k, a(k))$, c'est-à-dire essentiellement les premiers et les composés de a minimal - elle pourrait donc *effacer* la finesse (revenir à de la densité) ; (ii) on ne sait pas encore si cette comparaison est plus démontrable que l'énoncé initial. Là encore, le protocole ci-dessous tranche expérimentalement.

6.6. Étape 2 : la structure locale du graphe critique encode (P1)

Le recensement (étape 1) dit *combien* il y a de 2-cycles critiques ; l'étape 2 examine *lesquels* : pour chaque N , l'ensemble des écarts p (avec $3 \leq p \leq N/2$) tels que $\{i, i + p\}$ soit un 2-cycle critique de

W_N - indépendant de i par translation, c'est donc une donnée de structure du graphe critique, pas de sa seule numérotation.

Proposition 10. *Soit q un nombre premier impair. Dans la matrice réelle :*

1. *si $q \nmid N$: un écart p divisible par q ne peut être premier que si $p = q$; donc l'ensemble des écarts critiques contient au plus une valeur divisible par q ;*
2. *si $q \mid N$: un écart $p \neq q$ divisible par q force $N - p \equiv 0 \pmod{q}$, donc $N - p$ composé : aucun écart critique divisible par q , sauf $p = q$.*

En particulier, la distribution des écarts critiques modulo q évite la classe 0 (à l'exception près de $p = q$) : c'est l'observable structurel correspondant à la propriété fine (P1) - les zéros de la matrice de divisibilité sont organisés en progressions arithmétiques, ce qu'aucun ensemble aléatoire n'imité.

N	part des écarts critiques réel	divisibles par 3 Cramér (3 tirages)	par 5 réel	par 7 Cramér
$30030 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$	0	0,33 - 0,34	0	0,13 - 0,15
$27720 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$	0	0 - 0,33	0	0,13 - 0,14
$24578 = 2 \cdot 12289$	0 ¹	0,36 - 0,37	0	0,14 - 0,16
$9998 = 2 \cdot 4999$	0	0,33 - 0,45	0	0,14 - 0,18
$6006 = 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$	0	0 - 0,43	0	0 - 0

Pour la matrice réelle, la part des écarts critiques divisibles par $q \in \{3, 5, 7, 11\}$ est *nulle* (à l'exception $p = q$ près, toujours et seulement observée pour $p = q$), conformément à la proposition ; pour les tirages de Cramér, elle vaut $\approx 1/3, 1/5, 1/7, 1/11$ - l'uniformité des résidus, signature d'une absence totale de structure. L'observable structurelle "distribution des écarts critiques modulo q " est donc *fine*, et elle est la traduction exacte, dans le graphe critique de W_N , de la périodicité des colonnes de la matrice de divisibilité : les écarts disponibles pour former des 2-cycles critiques vivent dans des classes de résidus déterminées par les *petits diviseurs premiers de N* et des écarts eux-mêmes.

Comptes rendus d'expériences manquées. Un premier passage de cette étape donnait "Cramér ≈ 0 " comme le réel - résultat artefact : le contrôle itérait les écarts sur la liste des *vrais* premiers au lieu des membres du tirage aléatoire, réintroduisant la primalité réelle côté Cramér. Corrigé ci-dessus. Ce genre d'erreur (contrôle contaminé par l'objet testé) est précisément celui que le protocole est chargé d'attraper ; il faut l'appliquer au contrôle lui-même.

Ce que l'étape 2 établit, et n'établit pas. Établi : le graphe critique de W_N porte une information structurelle fine, inimitable par du bruit de même densité - les écarts critiques sont confinés à des classes de résidus non nulles modulo chaque petit premier, contrainte multiplicative lue directement dans le calcul min-plus. Non établi : que cette contrainte *force* l'existence d'au moins un 2-cycle critique pour tout N pair. La proposition ?? restreint le lieu de recherche (les classes $\neq 0$), exactement comme un crible - et c'est bien là que réapparaît, au sens de la section ??, la question centrale : la restriction par résidus est une information que le crible sait déjà exploiter (jusqu'au mur de Selberg). Le levier éventuellement nouveau serait d'ordre *min-plus* : par exemple

1. L'unique exception prévue par la proposition : l'écart $p = 7$ lui-même, quand $N - 7$ est premier - observé exactement une fois sur les 202 écarts de $N = 24578$.

une contrainte de cohérence entre cycles - si $\{i, i+p\}$ et $\{i, i+r\}$ sont critiques, alors $\{i+p, i+r\}$ l'est aussi dès que $|p-r|$ et $N-|p-r|$ sont premiers - qui fait du graphe critique un objet à symétries internes (graphe de Cayley sur les écarts critiques), susceptible d'arguments de théorie des groupes plutôt que de comptage. C'est l'étape 4 de la feuille de route.

6.7. La transformée de Legendre-Fenchel : une “Fourier min-plus”

Second instrument, plus théorique. La convolution min-plus

$$(f \otimes g)(N) = \min_p (f(p) + g(N-p))$$

est exactement la *convolution infimale* de l'analyse convexe, et la transformée de Legendre-Fenchel

$$f^*(s) = \sup_k (s \cdot k - f(k))$$

la convertit en addition ordinaire : $(f \otimes g)^* = f^* + g^*$ (à ensembllement convexe près). De même que la transformée de Fourier diagonalise la convolution classique - c'est elle qui a permis le comptage des représentations par FFT dans la note de reprise -, la transformée de Fenchel diagonalise la convolution min-plus : elle est l'analogue tropical de la “valeurs propres” au sens où a^* encode le profil convexe de a , et Goldbach devient la comparaison de $2a^*$ avec la transformée du peigne des nombres pairs. Deux réserves honnêtes : (i) la transformée ne retient que l'enveloppe convexe supérieure des points $(k, a(k))$, c'est-à-dire essentiellement les premiers et les composés de a minimal - elle pourrait donc *effacer* la finesse (revenir à de la densité) ; (ii) on ne sait pas encore si cette comparaison est plus démontrable que l'énoncé initial. Là encore, le protocole ci-dessous tranche expérimentalement.

6.8. Étape 2 : la structure locale du graphe critique encode (P1)

Le recensement (étape 1) dit *combien* il y a de 2-cycles critiques ; l'étape 2 examine *lesquels* : pour chaque N , l'ensemble des écarts p (avec $3 \leq p \leq N/2$) tels que $\{i, i+p\}$ soit un 2-cycle critique de W_N - indépendant de i par translation, c'est donc une donnée de structure du graphe critique, pas de sa seule numérotation.

Proposition 11. *Soit q un nombre premier impair. Dans la matrice réelle :*

1. *si $q \nmid N$: un écart p divisible par q ne peut être premier que si $p = q$; donc l'ensemble des écarts critiques contient au plus une valeur divisible par q ;*
2. *si $q \mid N$: un écart $p \neq q$ divisible par q force $N - p \equiv 0 \pmod{q}$, donc $N - p$ composé : aucun écart critique divisible par q , sauf $p = q$.*

En particulier, la distribution des écarts critiques modulo q évite la classe 0 (à l'exception près de $p = q$) : c'est l'observable structurel correspondant à la propriété fine (P1) - les zéros de la matrice de divisibilité sont organisés en progressions arithmétiques, ce qu'aucun ensemble aléatoire n'imité.

N	part des écarts critiques réel	divisibles par 3 Cramér (3 tirages)	par 5 réel	par 7 Cramér
$30030 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$	0	0,33 - 0,34	0	0,13 - 0,15
$27720 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$	0	0 - 0,33	0	0,13 - 0,14
$24578 = 2 \cdot 12289$	0 ²	0,36 - 0,37	0	0,14 - 0,16
$9998 = 2 \cdot 4999$	0	0,33 - 0,45	0	0,14 - 0,18
$6006 = 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$	0	0 - 0,43	0	0 - 0

Pour la matrice réelle, la part des écarts critiques divisibles par $q \in \{3, 5, 7, 11\}$ est *nulle* (à l'exception $p = q$ près, toujours et seulement observée pour $p = q$), conformément à la proposition ; pour les tirages de Cramér, elle vaut $\approx 1/3, 1/5, 1/7, 1/11$ - l'uniformité des résidus, signature d'une absence totale de structure. L'observable structurelle "distribution des écarts critiques modulo q " est donc *fine*, et elle est la traduction exacte, dans le graphe critique de W_N , de la périodicité des colonnes de la matrice de divisibilité : les écarts disponibles pour former des 2-cycles critiques vivent dans des classes de résidus déterminées par les *petits diviseurs premiers de N* et des écarts eux-mêmes.

Comptes rendus d'expériences manquées. Un premier passage de cette étape donnait "Cramér ≈ 0 " comme le réel - résultat artefact : le contrôle itérait les écarts sur la liste des *vrais* premiers au lieu des membres du tirage aléatoire, réintroduisant la primalité réelle côté Cramér. Corrigé ci-dessus. Ce genre d'erreur (contrôle contaminé par l'objet testé) est précisément celui que le protocole est chargé d'attraper ; il faut l'appliquer au contrôle lui-même.

Ce que l'étape 2 établit, et n'établit pas. Établi : le graphe critique de W_N porte une information structurelle fine, inimitable par du bruit de même densité - les écarts critiques sont confinés à des classes de résidus non nulles modulo chaque petit premier, contrainte multiplicative lue directement dans le calcul min-plus. Non établi : que cette contrainte *force* l'existence d'au moins un 2-cycle critique pour tout N pair. La proposition ?? restreint le lieu de recherche (les classes $\neq 0$), exactement comme un crible - et c'est bien là que réapparaît, au sens de la section ??, la question centrale : la restriction par résidus est une information que le crible sait déjà exploiter (jusqu'au mur de Selberg). Le levier éventuellement nouveau serait d'ordre *min-plus* : par exemple une contrainte de cohérence entre cycles - si $\{i, i+p\}$ et $\{i, i+r\}$ sont critiques, alors $\{i+p, i+r\}$ l'est aussi dès que $|p-r|$ et $N - |p-r|$ sont premiers - qui fait du graphe critique un objet à symétries internes (graphe de Cayley sur les écarts critiques), susceptible d'arguments de théorie des groupes plutôt que de comptage. C'est l'étape 4 de la feuille de route.

6.9. La transformée de Legendre-Fenchel : une "Fourier min-plus"

Second instrument, plus théorique. La convolution min-plus

$$(f \otimes g)(N) = \min_p (f(p) + g(N-p))$$

est exactement la *convolution infimale* de l'analyse convexe, et la transformée de Legendre-Fenchel

$$f^*(s) = \sup_k (s \cdot k - f(k))$$

la convertit en addition ordinaire : $(f \otimes g)^* = f^* + g^*$ (à ensemblement convexe près). De même que la transformée de Fourier diagonalise la convolution classique - c'est elle qui a permis le comptage des représentations par FFT dans la note de reprise -, la transformée de Fenchel diagonalise la convolution min-plus : elle est l'analogue tropical de la "valeurs propres" au sens où a^* encode le profil convexe de a , et Goldbach devient la comparaison de $2a^*$ avec la transformée du peigne

2. L'unique exception prévue par la proposition : l'écart $p = 7$ lui-même, quand $N - 7$ est premier - observé exactement une fois sur les 202 écarts de $N = 24578$.

des nombres pairs. Deux réserves honnêtes : (i) la transformée ne retient que l’enveloppe convexe supérieure des points $(k, a(k))$, c’est-à-dire essentiellement les premiers et les composés de a minimal - elle pourrait donc *effacer* la finesse (revenir à de la densité) ; (ii) on ne sait pas encore si cette comparaison est plus démontrable que l’énoncé initial. Là encore, le protocole ci-dessous tranche expérimentalement.

6.10. Le protocole de contrôle, et la feuille de route

Tout ce programme est gouverné par une règle unique, héritée de l’expérience de juillet 2026 :

Protocole : pour tout observable min-plus Φ (valeur propre, recensement de cycles critiques, transformée de Fenchel, vecteurs propres min-plus, etc.), calculer Φ (matrice réelle) et Φ (matrice Cramér) sur ~ 20 tirages. Si les distributions coïncident, Φ est grossier : on le jette. Si elles diffèrent systématiquement, Φ est fin : c’est un candidat levier.

Feuille de route, dans l’ordre croissant du coût :

1. *Recensement fin* : étendre le recensement des 2-cycles critiques à grand N (coût $O(N^2)$, trivial) et vérifier que $g(N) \approx 2C_2 \mathfrak{S}(N) N/(\ln N)^2$ suit la série singulière - c’est-à-dire que le graphe critique min-plus *voit* la factorisation de N . Fait à petite échelle ci-dessus ; à confirmer en grande.
2. *Structure du graphe critique* : pour les N où $g(N)$ est anormalement petit (les “vallées” de la comète de Goldbach, comme $N = 2p$, p premier), examiner si la structure locale des cycles critiques de W_N reflète les contraintes de divisibilité (P1) - c’est le premier endroit où la finesse doit se voir si elle se voit quelque part.
3. *Vecteurs propres min-plus* : calculer les vecteurs propres de W_N (points fixes de $x \mapsto W_N \otimes x$, associés à $\lambda = 0$) et leurs bassins d’attraction (itération de Collatz-Wielandt min-plus) ; tester au protocole de contrôle.
4. *Profil de Fenchel* : calculer a^* (fenêtré) réel vs Cramér ; si les profils diffèrent, chercher une inégalité convexifiée qui force $\text{tr}_{\oplus}(W_N^{\otimes 2}) = 0$.
5. *Objectif théorique* : une inégalité min-plus combinant (P1) - la périodicité des colonnes de la matrice de divisibilité - et le calcul $W_N^{\otimes 2}$, qui forcerait un 2-cycle critique. Aucune garantie de succès ; mais chaque étape est maintenant un calcul bien défini, avec un test de falsification intégré.

7. Conclusion

1. La matrice des quotients x/y est un crible : la primalité y est une propriété intrinsèque des lignes (proposition ??), et la matrice des écarts $|x - y|$ porte la loi additive. Les deux matrices ensemble contiennent exactement ce qu’il faut pour *exprimer* Goldbach.
2. La fonction de composabilité $a(n)$ et sa convolution min-plus donnent une reformulation *équivalente* à Goldbach (théorème ??) : $(a \otimes a)(N) = 0$ pour tout N pair ≥ 4 . Contrairement au modèle de mai 2026, la primalité y est interne au modèle, et l’information utilisée est multiplicative (fine), pas de pure densité (grossière).
3. “Propriété fine” a été défini : une propriété que les nombres premiers possèdent et qu’aucun ensemble de Cramér ne possède. Trois exemples fins ont été donnés (colonnes arithmétiques, témoin $\leq \sqrt{x}$, treillis des diviseurs), tous lisibles dans la matrice.

4. “Obstruction de parité” a été défini : le théorème de Selberg selon lequel les cribles ne peuvent pas distinguer 1 de 2 facteurs premiers, expliquant pourquoi le théorème de Chen (à un facteur près) n’a jamais pu être amélioré en Goldbach, et pourquoi la note de mai 2026, n’utilisant que de l’information grossière, ne pouvait rien démontrer.
5. La question “le calcul min-plus exploite-t-il la finesse, ou l’efface-t-il ?” a reçu un début de réponse expérimentale (section ??) : la valeur propre min-plus de la matrice de Goldbach W_N est un observable grossier ($\lambda = 0$ aussi pour Cramér), mais le recensement de ses cycles critiques est un observable fin (les comptes réels excèdent systématiquement les comptes Cramér, à la manière de la série singulière de Hardy-Littlewood, qui dépend de la factorisation de N). Le programme se poursuit par le protocole de contrôle : tout observable min-plus doit passer le test réel contre Cramér avant d’être un candidat levier.

A Programmes de vérification

A1. Matrices d’écart et de quotient

```
import numpy as np

n = 10
mmult = np.zeros((n, n))
for x in range(1, n+1):
    for y in range(1, n+1):
        mmult[x-1, y-1] = x / y
madd = np.zeros((n, n))
for x in range(1, n+1):
    for y in range(1, n+1):
        madd[x-1, y-1] = abs(x - y)
```

A2. Primalité par lecture de ligne (proposition ??)

```
def est_premier_par_ligne(x):
    # x >= 2 premier ssi x/y non entier pour tout 2 <= y <= x-1
    # (il suffit de tester y <= sqrt(x))
    if x < 2: return False
    y = 2
    while y * y <= x:
        if x % y == 0: return False
        y += 1
    return True
```

A3. Fonction de composabilité et convolution min-plus (théorème ??)

```
def a(k):
    # nombre de diviseurs de k strictement entre 1 et k
    # (a(k) = 0 ssi k est premier) ; k >= 2
```

```

    return sum(1 for d in range(2, k) if k % d == 0)

def goldbach_minplus(N):
    # (a(x) a)(N) = min sur 2 <= p <= N-2 de a(p) + a(N-p)
    best, argmin = float("inf"), []
    for p in range(2, N - 1):
        v = a(p) + a(N - p)
        if v < best:
            best, argmin = v, [p]
        elif v == best:
            argmin.append(p)
    return best, argmin

for N in range(4, 21, 2):
    val, arg = goldbach_minplus(N)
    print(N, val, arg)    # val = 0 ; arg = decompositions de Goldbach

```

A4. Matrice de Goldbach W_N , trace min-plus, valeur propre de Karp (section ??)

```

INF = float("inf")

def a(k):
    # nb de diviseurs 2<=d<=k-1 ; a(k)=0 ssi k premier ; +inf si k<2
    if k < 2: return INF
    return sum(1 for d in range(2, k) if k % d == 0)

def build_W(N):
    # matrice de Goldbach sur les residus mod N
    return [[a(((j - i) % N)) for j in range(N)] for i in range(N)]

def trace_minplus_carre(W):
    # = (a(x) a)(N) : Goldbach(N) ssi cette trace vaut 0
    m = len(W)
    return min(W[i][k] + W[k][i]
               for i in range(m) for k in range(m)
               if W[i][k] < INF and W[k][i] < INF)

def cycles_critiques_2(W):
    # vaut N * g(N) : recensement fin (observable "serie singuliere")
    m = len(W)
    return sum(1 for i in range(m) for j in range(i+1, m)
               if W[i][j] + W[j][i] == 0)

def karp_lambda(W):

```

```

# valeur propre min-plus = poids moyen minimal d'un cycle,  $O(m^3)$ 
m = len(W)
D = [[INF]*m for _ in range(m+1)]
D[0][0] = 0
for k in range(1, m+1):
    for v in range(m):
        D[k][v] = min(D[k-1][u] + W[u][v]
                       for u in range(m)
                       if D[k-1][u] < INF and W[u][v] < INF)
    lam = INF
    for v in range(m):
        if D[m][v] == INF: continue
        mx = max((D[m][v] - D[k][v]) / (m - k)
                  for k in range(m) if D[k][v] < INF)
        lam = min(lam, mx)
    return lam

for N in (30, 60, 100):
    W = build_W(N)
    print(N, trace_minplus_carre(W),      # 0 ssi Goldbach(N)
          cycles_critiques_2(W),          # = N * g(N)
          karp_lambda(W))                  # 0 (observable grossier)

```